

Triage per i pazienti che devono essere sottoposti a vaccinazione con mRNA COVID-19

Tradotto da: Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States
<https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html>

NESSUNA CONTROINDICAZIONE ALLA VACCINAZIONE	VACCINARE CON PRECAUZIONI	CONTROINDICATA LA VACCINAZIONE
<p>Particolari condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Soggetti immunocompromessi Gravidanza Allattamento <hr/> <p>Come comportarsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Fornire informazioni aggiuntive Tenere in osservazione per 15min 	<p>Particolari condizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Malattia di grado moderato / severo <hr/> <p>Come comportarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valutare il rischio Se possibile rinviare la vaccinazione Se si vaccina, tenere in osservazione per 15min 	<p>Particolari condizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna <hr/> <p>Come comportarsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Non applicabile
<p>Allergie: Storia di allergie non correlate a componenti del vaccino a mRNA per COVID-19, ad altri vaccini, a terapie iniettive, o al Polisorbato. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Allergie a farmaci per uso orale (incluso l'equivalente orale di un farmaco iniettivo) Storia di allergie a alimenti, insetti, veleno, lattice o ad allergeni ambientali ecc. Familiarità per allergie <hr/> <p>Come comportarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Soggetti che hanno avuto reazioni anafilattiche da qualsiasi causa: osservazione di 30 min Tutti gli altri: osservazione di 15 min 	<p>Allergie: Storia di reazione immediata a vaccini o a terapie iniettive (ad eccezione di reazioni a componenti del vaccino a mRNA per COVID-19 o Polisorbato, in quanto in tal caso la vaccinazione è controindicata)</p> <hr/> <p>Come comportarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valutare il rischio Considerare di rinviare la vaccinazione e/o consultare specialisti allergologi/immunologi Se si vaccina, tenere in osservazione 30 min 	<p>Allergie: Tutte le seguenti sono controindicazioni a ricevere il vaccino</p> <ul style="list-style-type: none"> Reazione allergica severa (ad esempio anafilassi) a seguito di precedente somministrazione di un vaccino a mRNA per COVID 19, o suoi componenti Reazione allergica immediata, di qualsiasi grado di severità, a precedente dose di un vaccino a mRNA per COVID 19 o suoi componenti (incluso il polietilene glicole) Reazione allergica immediata, di qualsiasi grado di severità, al Polisorbato <hr/> <p>Come comportarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Non vaccinare Consultare specialisti allergologi/immunologi