

Risposte ai precedenti questionari 2015, vol. 15, n. 3

Quali evidenze nella VLCD • F.G. Marelli

Qual è la quota calorica prevista nelle diete VLCDs?

- tra 500 e 1000 calorie/die
- tra 400 e 800 calorie/die**
- tra 600 e 900 calorie/die
- tra 800 e 1200 calorie/die

Qual è la quota di carboidrati da non superare nelle diete VLCDs?

- < 50 g/die**
- < 60 g/die
- < 70 g/die
- < 80 g/die

La maggiore efficacia delle diete VLCDs si riscontra nel:

- breve termine**
- medio termine
- lungo termine
- breve e medio termine

Nei diabetici tipo 2 le diete VLCDs migliorano:

- l'insulino-sensibilità
- la funzione beta-cellulare
- entrambe**
- nessuna delle due

Malattie dell'ipofisi: cosa deve sapere il medico di medicina generale • S. Marino, S. Puglisi, O. Cotta, U. Alecci, S. Inferrera, S. Cannavò

Gli adenomi ipofisari rappresentano:

- il 100% dei tumori intracranici
- il 50% dei tumori intracranici
- il 10-15% dei tumori intracranici**

L'iperprolattinemia può essere determinata da:

- condizioni fisiologiche
- assunzione di farmaci
- malattie endocrine e sistemiche
- tutte le precedenti**
- nessuna delle precedenti

Una diuresi particolarmente aumentata diventa sospetta di diabete insipido quando supera nelle 24 h:

- 1500 cc
- 2000 cc
- 3000 cc**

Quali tra questi sintomi è errato nel deficit di GH nell'adulto?

- aumento dell'adipe viscerale
- riduzione della massa magra e della forza muscolare
- ipopigmentazione cutanea**
- ipotrofia della cute e degli annessi