

Linfadenite batterica acuta localizzata

R_x Trattamento

☑☑☑ Considerazioni cliniche

Importante:

- L'ingrandimento dei linfonodi è causato nella maggior parte dei casi da infezioni virali, pertanto gli antibiotici **non sono necessari**
- È appropriato un approccio di vigile attesa con follow-up (salvo sospetto di neoplasia maligna)

Se i sintomi sono compatibili con un'infezione batterica, è indicato un trattamento empirico contro *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes* (*Streptococcus* di gruppo A)

Nota: l'anamnesi è fondamentale per adattare il trattamento, se necessario



Durata del trattamento antibiotico

5 giorni

R_x Trattamento antibiotico

Tutti i dosaggi si intendono per una funzionalità renale normale. Gli antibiotici sono elencati in ordine alfabetico e devono essere tutti considerati come pari opzioni di trattamento se non diversamente indicato.



Amoxicillina+acido clavulanico 875 mg+125 mg
q8h **ORALE**

OPPURE



Cefalexina 1 g q12h **ORALE**

OPPURE



Flucloxacillina 1 g q8h **ORALE**

Flucloxacillina e cefalexina hanno uno spettro più ristretto di attività antibatterica rispetto ad amoxicillina+acido clavulanico con buona efficacia nelle infezioni lievi della cute e dei tessuti molli. Dal punto di vista della stewardship antibiotica, queste sono le opzioni preferite, laddove possibile.