

Sinusite acuta

Pagina 1 di 2

Definizione

Infiammazione sintomatica dei seni paranasali e della cavità nasale

Agenti patogeni più probabili

Virus respiratori:

- Influenza virus (A e B)
- Rhinovirus
- Virus respiratorio sinciziale (VRS)
- Altri virus respiratori (compreso SARS-CoV-2)

Batteri (raramente):

- *Streptococcus pneumoniae*
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*

Diagnosi

Manifestazione clinica

- La diagnosi è clinica; i sintomi della sinusite batterica si sovrappongono a quelli della sinusite virale
- I sintomi di solito durano 10-14 giorni e sono autolimitanti
- I principali sintomi sono rinorrea, ostruzione o congestione nasale, dolore dentale o facciale unilaterale, sensazione di pienezza o pressione in viso e a volte tosse
- La localizzazione del dolore dipende dai seni interessati
- Si può sospettare una sinusite batterica acuta se:
 - I segni/sintomi persistono per ≥ 10 giorni senza miglioramento
OPPURE
 - Si osserva un significativo peggioramento dei sintomi dopo una fase iniziale lieve

Test microbiologici

Di solito non necessari

Altri test di laboratorio

Di solito non necessari

Imaging

Di solito non necessario salvo in caso di sospetta complicanza o diagnosi alternativa



Gli agenti eziologici sono stati aggiornati sulla base dell'epidemiologia in Italia.

Sulla base delle indicazioni riportate in scheda tecnica per la amoxicillina+acido clavulanico in Italia, si è ritenuto di suggerire un dosaggio di 875 mg+125 mg mantenendo l'intervallo di somministrazione ogni 8 ore.