



SIMG

SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE



Vaccinazione anti-pneumococcica

VACCINI A DISPOSIZIONE

- Vaccino coniugato 13-valente: Prevenar 13
- Vaccino coniugato 15-valente: Vaxneuvance
- Vaccino polisaccaridico 23-valente: Pneumovax
- Vaccino coniugato 20-valente: Apexxnar

TIMING

Vaccino coniugato 13-valente: Prevenar 13

- Età compresa tra i 2 e i 64 anni affetti da patologie o condizioni predisponenti previste
- Non è prevista la fornitura e si possono utilizzare solo le dosi in giacenza negli studio dei MMG-PLS non scadute

Vaccino coniugato 15-valente: Vaxneuvance

- Età compresa tra i 2 e i 17 anni, senza patologie (catch up di soggetti non vaccinati nell'infanzia)
- Età ≥ 65 anni a seconda della disponibilità e degli accordi delle singole Regioni
- ≥ 18 anni con marcata compromissione immunitaria

Vaccino polisaccaridico 23-valente: Pneumovax

- Solo nell'ambito della schedula sequenziale, ovvero dopo un anno dopo la vaccinazione con Vaxneuvance o Prevenar 13.
- Età ≥ 2 anni
- Se età compresa tra 2 e 64 anni è necessario essere affetti da una delle patologie o condizioni predisponenti previste

Vaccino coniugato 20-valente: Apexxnar

- Per tutti i soggetti ≥ 18 anni che iniziano la vaccinazione antipneumococcica per la prima volta
- Età dai 18 ai 64 anni affetti da una delle patologie o condizioni predisponenti previste, inclusi i soggetti con marcata compromissione immunitaria
- Età ≥ 65 anni: tutti i soggetti
- NON è previsto un richiamo (CDC, ACIP). Alcune Regioni indicano la possibilità di un richiamo sequenziale con Pneumovax



INDICAZIONI

COORTE DEI 65enni

PER CONDIZIONI PATOLOGICHE

- Alcoolismo cronico
- Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia
- Cardio/pneumo/epatopatie croniche
- Diabete mellito
- Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia
- Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool
- Immunodeficienze congenite o acquisite
- Infezione da HIV
- Insufficienza renale/surrenalica cronica, sindrome nefrosica
- Malattie polmonari croniche
- Neoplasie diffuse
- Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)
- Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine
- Portatori di impianto cocleare
- Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento
- Trapianto d'organo o di midollo
- Difetti congeniti e acquisiti del complemento
- Soggetti con diabete mellito
- Soggetti con patologia cardiovascolare, esclusa l'ipertensione isolata, previa valutazione del rischio
- Soggetti con BPCO e asma bronchiale



COSOMMINISTRAZIONI

Vaccino coniugato 13-valente: Prevenar 13

- Prevenar 13 può essere co-somministrato con il vaccino stagionale trivalente dell'influenza (TIV).
- Prevenar 13 può essere somministrato in concomitanza al vaccino inattivato quadrivalente dell'influenza (QIV) stagionale.
- L'uso di Prevenar 13 in concomitanza con altri vaccini non è stato studiato.

Vaccino coniugato 15-valente: Vaxneuvance

- Età < 2 anni: Vaxneuvance può essere somministrato in concomitanza con qualsiasi dei seguenti antigeni vaccinali, sia come vaccini monovalenti che combinati: vaccino contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite (sierotipi 1, 2 e 3), epatite A, epatite B, Haemophilus influenzae di tipo b, morbillo, parotite, rosolia, varicella e rotavirus.
- Età tra i 2 e i 18 anni: Non sono disponibili dati sulla somministrazione di Vaxneuvance in concomitanza con altri vaccini.
- Adulti: Vaxneuvance può essere somministrato in concomitanza con il vaccino antinfluenzale quadrivalente stagionale (virione frazionato, inattivato). Non sono disponibili dati sulla somministrazione di Vaxneuvance in concomitanza con altri vaccini.

Vaccino polisaccaridico 23-valente: Pneumovax

- Il vaccino pneumococcico può essere somministrato insieme al vaccino influenzale purché in siti separati di iniezione ed utilizzando aghi differenti.
- L'uso concomitante di PNEUMOVAX e ZOSTAVAX ha mostrato la riduzione dell'immunogenicità di ZOSTAVAX in uno studio clinico di piccole dimensioni. Tuttavia, i dati raccolti in un ampio studio osservazionale non hanno indicato un rischio aumentato di sviluppare l'herpes zoster a seguito dell'uso concomitante dei due vaccini.

Vaccino coniugato 20-valente: Apexnar

- Non sono stati effettuati studi d'interazione.
- Vaccini iniettabili diversi devono sempre essere somministrati in sedi di vaccinazione differenti e non miscelare Apexnar con altri vaccini/medicinali nella stessa siringa.