



## Vaccinazione anti-Herpes Zoster

### VACCINI A DISPOSIZIONE

- VACCINO RICOMBINANTE ADIUVATO: [SHINGRIX](#)
- VACCINO VIVO ATTENUATO: [ZOSTAVAX](#)

### TIMING

#### VACCINO RICOMBINANTE ADIUVATO

- DAI 18 ANNI IN SU
- 2 DOSI (0, 2-6 MESI)
- Nei soggetti che sono o che potrebbero diventare immunodeficienti o immunodepressi a causa di malattia o terapia e che trarrebbero beneficio da una schedula accelerata, la seconda dose di RZV può essere somministrata da 1 a 2 mesi dopo la dose iniziale

#### VACCINO VIVO ATTENUATO

- DAI 50 ANNI IN SU
- 1 DOSE SINGOLA

### INDICAZIONI

#### COORTE DEI 65enni

#### PER CONDIZIONI PATOLOGICHE

- Soggetti con diabete mellito
- Soggetti con patologia cardiovascolare, esclusa l'ipertensione isolata, previa valutazione del rischio
- Soggetti con BPCO e asma bronchiale

#### PER CONDIZIONI PATOLOGICHE MA **ESCLUSIVAMENTE CON VACCINO RICOMBINANTE ADIUVATO**

- Soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva
- Soggetti con insufficienza renale cronica ed in dialisi
- Soggetti con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster



	VACCINO RICOMBINANTE ADIUVATO SHINGRIX	VACCINO VIVO ATTENUATO ZOSTAVAX
Soggetti di età pari a 65 anni	Somministrabile	Somministrabile
Soggetti nella fascia 18 - 49 anni ad aumentato rischio per <ul style="list-style-type: none"><li>• Diabete mellito</li><li>• Patologie cardiovascolari</li><li>• Asma – BPCO</li></ul>	Somministrabile	—
Soggetti di età pari o superiore a 50 anni ad aumentato rischio per <ul style="list-style-type: none"><li>• Diabete mellito</li><li>• Patologie cardiovascolari</li><li>• Asma – BPCO</li></ul>	Somministrabile	Somministrabile
Soggetti di età pari o superiore ai 18 anni <ul style="list-style-type: none"><li>• con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva</li><li>• con insufficienza renale cronica ed in dialisi</li><li>• con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster</li></ul>	Somministrabile	—
Gravidanza	—	—

## CONTROINDICAZIONI

### VACCINO RICOMBINANTE ADIUVATO

- Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti
- Evitare l'uso in gravidanza

### VACCINO VIVO ATTENUATO

- Ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti
- Patologie o trattamenti farmacologici che abbiano determinato immunodepressione
- Tubercolosi attiva non trattata
- Gravidanza

## COSOMMINISTRAZIONI

### VACCINO RICOMBINANTE ADIUVATO

- Antinfluenzale non adiuvato
- Anti COVID-19
- Anti Pneumococcico coniugato: PCV 13
- Anti Pneumococcico polisaccaridico: PPV23
- Anti DTPA

### VACCINO VIVO ATTENUATO

- Antinfluenzale inattivato
- Anti COVID-19 (dato non disponibile in RCP)
- Anti Pneumococcico polisaccaridico: PPV23