Tabella 1. Definizione operativa degli indicatori WOP e relativi LAP.

Numeratore, denominatore e Livello Accettabile di Performance (LAP), distinti per relazione con la Scheda PAIN

Indicatore	Numeratore	Denominatore	LAP
A. Indicatori NON correlati alla Scheda PAIN			
WP25-PAIN01	Pazienti con diagnosi di dipendenza, in terapia con oppioidi, con almeno una visita algologica registrata nei 7 giorni successivi alla prescrizione della terapia.	Pazienti con diagnosi di dipendenza in terapia con oppioidi.	**≥90%**
WP25-PAIN02	Pazienti in terapia con oppioidi da oltre 90 giorni con almeno una visita algologica registrata negli ultimi 24 mesi.	Pazienti in terapia con oppioidi da oltre 90 giorni.	**≥50%**
WP25-PAIN03	Pazienti con diagnosi di malattia oncologica trattati con ROO e contemporaneamente con oppioidi slow-release a dose >=60 mg equivalenti di morfina per almeno 30 giorni.	Pazienti con diagnosi di malattia oncologica trattati con ROO.	**≥90%**
WP25-PAIN04	Pazienti senza diagnosi di malattia oncologica mai trattati con ROO.	Pazienti senza diagnosi di malattia oncologica.	**≥90%**
WP25-PAIN05	Pazienti in terapia con anticoagulanti orali (AVK o DOAC) senza prescrizione di FANS.	Pazienti in terapia con anticoagulanti orali (AVK o DOAC).	**≥80%**
WP25-PAIN06	Pazienti in terapia concomitante con anticoagulanti orali (AVK o DOAC) e SSRI senza prescrizione di FANS.	Pazienti in terapia concomitante con anticoagulanti orali (AVK o DOAC) e SSRI.	**≥80%**
WP25-PAIN07	Pazienti con diagnosi di dolore non sottoposti a trattamento continuativo con FANS per oltre 30 giorni.	Pazienti con diagnosi di dolore.	**≥80%**
WP25-PAIN09	Pazienti con prescrizione incidente di pregabalin per i quali è documentata una titolazione del trattamento.	Pazienti con prescrizione incidente di pregabalin.	**≥80%**
WP25-PAIN10	Pazienti con diagnosi di metastasi, GFR >=45 mL/min/1,73 m^2 e almeno una prescrizione di FANS.	Pazienti con diagnosi di metastasi e GFR >=45 mL/min/1,73 m^2.	**≥50%**
WP25-PAIN11	Pazienti con diagnosi di dolore neuropatico con almeno una prescrizione farmacologica coerente: amitriptilina, carbamazepina, oxcarbazepina, pregabalin, gabapentin, duloxetina, LAC o lidocaina patch.	Pazienti con diagnosi di dolore neuropatico.	**≥80%**
WP25-PAIN12	Pazienti di età <60 anni con diagnosi incidente di lombalgia (definizione ampia) e registrazione di imaging (TAC/RMN/RX) dopo almeno 12 settimane dalla diagnosi.	Pazienti di età <60 anni con diagnosi incidente di lombalgia secondo la definizione ampia.	**≥60%**
WP25-PAIN12_NW	Pazienti di età <60 anni con diagnosi incidente di lombalgia (definizione specifica) e registrazione di imaging (TAC/RMN/RX) dopo almeno 12 settimane dalla diagnosi.	Pazienti di età <60 anni con diagnosi incidente di lombalgia secondo la definizione specifica.	**≥60%**
WP25-PAIN13	Pazienti con diagnosi di dolore con prescrizione combinata di FANS e paracetamolo 1000 mg a distanza non superiore a 7 giorni.	Pazienti con diagnosi di dolore.	**Non previsto***
B. Indicatori correlati alla Scheda PAIN			
WP25-PAIN14	Pazienti con dolore cronico in terapia continuativa con farmaci analgesici con almeno una valutazione del dolore registrata mediante Scheda PAIN.	Pazienti con dolore cronico in terapia continuativa con farmaci analgesici.	**≥80%**
WP25-PAIN15	Pazienti in terapia continuativa con oppioidi da oltre 30 giorni con almeno una valutazione del dolore registrata mediante Scheda PAIN.	Pazienti in terapia continuativa con oppioidi da oltre 30 giorni.	**≥80%**
WP25-PAIN16	Pazienti con dolore in terapia cronica con antalgici con almeno una rivalutazione del dolore mediante Scheda PAIN.	Pazienti con dolore in terapia cronica con antalgici eleggibili alla rivalutazione mediante Scheda PAIN.	**≥60%**

Indicatore	Numeratore	Denominatore	LAP
WP25-PAIN17	Pazienti classificati dalla Scheda PAIN come dolore meccanico-strutturale non trattati con FANS.	Pazienti con dolore meccanico-strutturale identificato mediante Scheda PAIN.	**≥80%**
WP25-PAIN18	Pazienti con dolore nocicettivo infiammatorio, con almeno una controindicazione ai FANS, non trattati con FANS.	Pazienti classificati dalla Scheda PAIN come dolore nocicettivo infiammatorio e con almeno una controindicazione ai FANS.	**≥90%**
WP25-PAIN19	Pazienti classificati dalla Scheda PAIN come dolore neuropatico con prescrizione farmacologica coerente: amitriptilina, carbamazepina, oxcarbazepina, pregabalin, gabapentin, duloxetina, LAC o lidocaina patch.	Pazienti classificati dalla Scheda PAIN come dolore neuropatico.	**≥80%**
WP25-PAIN20	Pazienti classificati dalla Scheda PAIN come sindrome di dolore mista con terapia farmacologica coerente per la componente neuropatica associata a corticosteroide o FANS.	Pazienti classificati dalla Scheda PAIN come sindrome di dolore mista.	**≥80%**
WP25-PAIN21	Pazienti con dolore nocicettivo e sensibilizzazione spinale trattati con terapia combinata: FANS o corticosteroidi associati a paracetamolo, oppioidi, amitriptilina o duloxetina.	Pazienti con dolore nocicettivo e sensibilizzazione spinale identificati mediante Scheda PAIN.	**≥50%**

*Note: LAP = Livello Accettabile di Performance. *Per WP25-PAIN13 il report WOP non prevede un LAP, poiché l'indicatore è definito come indagine conoscitiva sui comportamenti prescrittivi e non come misura di appropriatezza. ROO = Rapid Onset Opioids; AVK = antagonisti della vitamina K; DOAC = anticoagulanti orali diretti; SSRI = inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina; FANS = farmaci antinfiammatori non steroidei; GFR = filtrato glomerulare; LAC = anestetici locali.*