Tabella 2. Andamento descrittivo degli indicatori WOP a T0, T1 e T2.

Codice	Indicatore	LAP	T0 - baseline (maggio 2025)		T1 - 6 mesi (novembre 2025)		T2 - 12 mesi (maggio 2026)	
			Proporzione nazionale (%)	Mediana [IQR] gruppi territoriali (%)	Proporzione nazionale (%)	Mediana [IQR] gruppi territoriali (%)	Proporzione nazionale (%)	Mediana [IQR] gruppi territoriali (%)
PAIN01	Dipendenza da oppioidi + visita algologica	≥90%	5,73%	1,14 [0,00–8,29]	7,67%	5,96 [0,00–12,27]	6,82%	3,04 [0,00–12,50]
PAIN02	Oppioidi >90 gg + visita algologica	≥50%	23,73%	25,36 [18,15–33,36]	23,03%	23,11 [16,38–33,54]	23,59%	24,86 [18,34–33,40]
PAIN03	Neoplasia + ROO e oppioidi ≥60 mg Eq. morfina ≥30 gg	≥90%	54,65%	55,00 [38,33–80,83]	52,38%	50,00 [36,46–89,29]	52,69%	50,00 [38,89–64,58]
PAIN04	Senza neoplasia, mai trattati con ROO	≥90%	99,98%	99,99 [99,98–99,99]	99,98%	99,98 [99,97–99,99]	99,98%	99,98 [99,97–99,99]
PAIN05	Anticoagulanti senza FANS	≥80%	76,51%	76,30 [70,48–79,89]	82,02%	81,57 [75,95–85,96]	83,77%	84,89 [76,73–87,39]
PAIN06	Anticoagulanti + SSRI senza FANS	≥80%	75,68%	74,89 [67,11–80,37]	81,94%	81,06 [73,65–87,76]	84,48%	83,11 [77,60–88,97]
PAIN07	Dolore senza FANS continuativi >30 gg	≥80%	65,43%	67,35 [64,00–69,74]	69,66%	71,70 [66,10–74,10]	70,47%	72,49 [68,09–74,18]
PAIN09	Pregabalin incidente con titolazione	≥80%	74,69%	76,75 [70,55–79,97]	76,21%	78,14 [72,98–82,35]	79,65%	82,64 [77,69–85,18]
PAIN10	Metastasi + GFR ≥45 con prescrizione di FANS	≥50%	36,24%	40,00 [26,04–48,33]	30,13%	24,72 [20,00–36,89]	25,49%	24,04 [16,84–33,15]
PAIN11	Dolore neuropatico, terapia farmacologica coerente	≥80%	22,71%	21,84 [19,97–27,47]	20,43%	19,20 [17,88–24,97]	18,00%	17,51 [16,97–20,60]
PAIN12	Lombalgia <60 anni, imaging ≥12 settimane – definizione ampia	≥60%	23,22%	24,77 [21,48–26,92]	21,12%	21,16 [18,49–25,19]	21,00%	21,28 [17,99–24,32]
PAIN12_NW	Lombalgia <60 anni, imaging ≥12 settimane – definizione specifica	≥60%	26,69%	27,24 [24,54–31,15]	24,12%	24,96 [22,25–29,05]	23,95%	25,00 [19,22–27,52]
PAIN13	FANS + paracetamolo 1000 mg	Non previsto	0,79%	0,55 [0,22–1,05]	1,34%	1,03 [0,48–1,59]	2,05%	1,48 [0,91–2,62]
PAIN14	Analgesici continuativi + almeno una Scheda PAIN	≥80%	5,96%	3,70 [1,34–6,81]	15,50%	10,32 [5,24–15,93]	15,68%	10,34 [7,25–18,03]
PAIN15	Oppioidi >30 gg + almeno una Scheda PAIN	≥80%	1,92%	0,66 [0,20–2,01]	5,21%	2,50 [1,82–5,86]	2,14%	1,14 [0,42–2,23]
PAIN16	Antalgici cronici + rivalutazione Scheda PAIN	≥60%	96,88%	100,00 [95,00–100,00]	93,76%	100,00 [96,37–100,00]	97,73%	100,00 [96,83–100,00]
PAIN17	Dolore meccanico-strutturale non trattato con FANS	≥80%	70,01%	67,16 [57,14–78,71]	71,18%	68,19 [59,58–80,98]	70,66%	69,17 [59,67–77,98]
PAIN18	Dolore nocicettivo infiammatorio con controindicazioni ai FANS e senza FANS	≥90%	68,28%	67,86 [58,34–81,31]	69,53%	67,54 [62,37–81,95]	68,89%	67,16 [62,84–75,00]
PAIN19	Dolore neuropatico (Scheda PAIN), terapia coerente	≥80%	81,08%	83,33 [67,95–86,19]	80,99%	81,13 [68,83–87,04]	79,46%	79,17 [68,89–83,50]
PAIN20	Dolore misto, terapia farmacologica coerente	≥80%	63,87%	57,14 [49,00–70,63]	60,89%	53,16 [46,43–66,97]	56,97%	51,72 [42,17–64,06]
PAIN21	Dolore nocicettivo con sensibilizzazione spinale, terapia combinata	≥50%	57,91%	46,50 [35,88–64,12]	55,52%	40,00 [35,88–64,47]	55,16%	44,64 [38,85–59,29]

Note. Le proporzioni nazionali sono calcolate sui numeratori/denominatori complessivi. La mediana [IQR] descrive la distribuzione delle percentuali nei gruppi territoriali, escludendo i valori 0/0 (N.R.) e il gruppo dei coordinatori; i valori 0/n sono mantenuti. Il LAP (Livello Accettabile di Performance) è un riferimento orientativo per l'autovalutazione e non una soglia assoluta di appropriatezza. Per PAIN13 il LAP non è previsto.