Tabella 3. Analisi longitudinale GLMM: variazioni temporali e di trend.

Codice	Indicatore	Δ T1-T0, pp [IC95%]	Δ T2-T0, pp [IC95%]	Δ T2-T1, pp [IC95%]	p value Tempo globale	p value Trend lineare
PAIN01	Dipendenza in terapia con oppioidi + visita algologica	+1,69 [-2,02; +5,40]	+1,00 [-2,67; +4,67]	-0,69 [-4,47; +3,08]	0,778	0,742
PAIN02	Oppioidi >90 gg + visita algologica	-0,74 [-2,37; +0,89]	-0,17 [-1,85; +1,51]	+0,57 [-1,18; +2,32]	0,778	0,826
PAIN03	Malattia oncologica con ROO + oppioidi	-1,20 [-15,62; +13,22]	-3,25 [-17,50; +11,01]	-2,04 [-16,34; +12,26]	0,903	0,764
PAIN04	Non oncologici mai trattati con ROO	-0,00 [-0,01; +0,00]	-0,01 [-0,01; +0,00]	-0,00 [-0,01; +0,00]	0,275	0,099
PAIN05	Anticoagulanti orali senza FANS	+5,72 [+4,74; +6,70]	+7,54 [+6,43; +8,66]	+1,82 [+1,03; +2,62]	**<0,001**	**<0,001**
PAIN06	Anticoagulanti + SSRI senza FANS	+6,57 [+4,03; +9,11]	+9,27 [+6,58; +11,95]	+2,69 [+0,22; +5,17]	**<0,001**	**<0,001**
PAIN07	Dolore non in terapia con FANS continuativi >30 gg	+3,88 [+3,07; +4,69]	+4,84 [+4,01; +5,68]	+0,96 [+0,16; +1,77]	**<0,001**	**<0,001**
PAIN09	Pregabalin incidente con titolazione	+1,71 [+0,58; +2,84]	+5,45 [+4,17; +6,73]	+3,74 [+2,46; +5,03]	**<0,001**	**<0,001**
PAIN10	Metastasi + GFR >=45 con prescrizione di FANS	-6,25 [-12,35; -0,14]	-9,65 [-15,66; -3,64]	-3,40 [-8,99; +2,18]	**0,010**	**0,003**
PAIN11	Dolore neuropatico con prescrizione farmacologica coerente	-2,44 [-3,02; -1,87]	-4,77 [-5,43; -4,12]	-2,33 [-2,88; -1,78]	**<0,001**	**<0,001**
PAIN12	Lombalgia <60 anni: imaging dopo >=12 settimane (definizione ampia)	-2,39 [-4,24; -0,54]	-2,84 [-4,71; -0,97]	-0,45 [-2,34; +1,45]	**0,008**	**0,004**
PAIN12_NW	Lombalgia <60 anni: imaging dopo >=12 settimane (definizione specifica)	-2,79 [-4,76; -0,82]	-3,26 [-5,25; -1,27]	-0,47 [-2,49; +1,55]	**0,004**	**0,002**
PAIN13	Dolore in terapia combinata FANS/paracetamolo 1000 mg	+0,49 [+0,26; +0,72]	+1,10 [+0,65; +1,55]	+0,61 [+0,32; +0,90]	**<0,001**	**<0,001**
PAIN14	Analgesici continuativi + almeno una valutazione Scheda PAIN	+8,05 [+5,17; +10,92]	+8,43 [+5,45; +11,42]	+0,39 [-0,69; +1,46]	**<0,001**	**<0,001**
PAIN15	Oppiacei >30 gg + almeno una valutazione Scheda PAIN	+2,54 [+1,41; +3,66]	+0,24 [-0,23; +0,71]	-2,30 [-3,39; -1,22]	**<0,001**	**0,003**
PAIN16	Antalgici cronici + almeno una rivalutazione Scheda PAIN	-2,72 [-5,47; +0,03]	+0,96 [-1,13; +3,06]	+3,69 [+0,82; +6,55]	**<0,001**	**0,025**
PAIN17	Dolore meccanico strutturale non trattato con FANS	+1,15 [-2,24; +4,54]	+0,65 [-2,73; +4,03]	-0,50 [-3,86; +2,86]	0,884	0,781
PAIN18	Dolore nocicettivo infiammatorio con controindicazioni ai FANS e non trattato con FANS	+1,48 [-4,40; +7,37]	+0,53 [-5,34; +6,40]	-0,95 [-6,78; +4,88]	0,903	0,862
PAIN19	Dolore neuropatico (Scheda PAIN) con terapia coerente	-0,63 [-5,25; +3,98]	-2,11 [-6,81; +2,60]	-1,47 [-6,21; +3,27]	0,778	0,524
PAIN20	Sindrome di dolore mista (Scheda PAIN) con terapia coerente	-3,47 [-7,12; +0,18]	-6,46 [-10,10; -2,82]	-2,99 [-6,63; +0,65]	**0,004**	**0,001**
PAIN21	Dolore nocicettivo con sensibilizzazione spinale in terapia combinata	-3,35 [-12,78; +6,08]	-4,07 [-13,57; +5,43]	-0,72 [-10,27; +8,83]	0,778	0,524

Note. Le differenze (Δ) sono espresse in punti percentuali (pp) con IC95% model-based. I p value riportati sono corretti per confronti multipli mediante procedura False Discovery Rate di Benjamini-Hochberg (FDR-BH), applicata separatamente al test dell'effetto globale del tempo e al test del trend lineare; i valori <0,05 sono evidenziati in grassetto.